

## 《广西道地药材目录》（第一批）

序号	道地药材名	标准收载药材名	来源	道地产区
1	九里香	九里香	为芸香科植物九里香 <i>Murraya exotica</i> L.和千里香 <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.的干燥叶和带叶嫩枝	以桂南、桂西南为主,包括百色、河池、崇左的靖西、那坡、隆林、凌云、乐业、德保、都安、龙州、宁明等地及其周边适宜地区
2	土茯苓	土茯苓	为百合科植物光叶菝葜 <i>Smilax glabra</i> Roxb.的干燥根茎	以梧州、钦州、玉林、百色、河池为主,包括苍梧、藤县、钦南、容县、陆川、博白、北流、靖西、那坡、田林、都安、宁明、大新等地及其周边适宜地区
3	山银花	山银花	为忍冬科植物灰毡毛忍冬 <i>Lonicera macranthoides</i> Hand.-Mazz.、红腺忍冬 <i>Lonicera hypoglauca</i> Miq.、华南忍冬 <i>Lonicera confusa</i> DC.或黄褐毛忍冬 <i>Lonicera fulvotomentosa</i> Hsu et S. C. Cheng的干燥花蕾或带初开的花	灰毡毛忍冬以桂林为主,包括资源、全州等地及周边地区;菝葜忍冬以南宁、来宾的石灰岩山地为主,包括马山、忻城等地及周边石灰岩山地;华南忍冬以桂东南为主,包括北流、陆川、博白、邕宁、上林、横县、上思等地及周边地区;黄褐毛忍冬以百色为主,包括隆林及周边石灰岩山地
4	广八角	八角茴香	为木兰科植物八角 <i>Illicium verum</i> Hook. f.的干燥成熟果实	以左江、右江一带市县为核心区域的武鸣、上林、龙州、宁明、百色、天等、德保、靖西、那坡、凭祥等桂西南市县,以及浦北、博白、玉林、苍梧、梧州、藤县、北流、岑溪、昭平等桂东和桂东南市县,东兰、凌云、凤山、巴马、西林、隆林等桂西北市县
5	广山药	广山药	为薯蓣科植物褐苞薯蓣 <i>Dioscorea persimilis</i> Prain et Burkill的干燥块茎	以南宁、贵港、玉林、贺州为主,包括邕宁、平南、桂平、陆川、博白、钟山、富川及其周边适宜地区
6	广山楂 (含广山楂叶)	广山楂 (含广山楂叶)	为蔷薇科植物台湾林檎 <i>Malus doumeri</i> (Bois) A. Chev.或光萼林檎 <i>Malus leiocalyca</i> S. Z. Huang的干燥成熟果实或叶	台湾林檎以桂林、百色、崇左为主,包括全州、兴安、德保、靖西、那坡、天峨、大新等地及其周边适宜地区,光萼林檎以来宾金秀及其周边适宜地区为主
7	广巴戟	巴戟天	为茜草科植物巴戟天 <i>Morinda officinalis</i> F. C. How的干燥根	以桂东南、桂南的梧州、贵港为中心,包括苍梧、藤县、岑溪、平南、桂平等西江流域周边地区为主
8	广地龙	地龙	为钜蚓科动物参环毛蚓 <i>Pheretima aspergillum</i> (E. Perrier) 的干燥体	西起钦州灵山,西北至贵港,包括钦州、灵山、陆川、博白、北流、容县等地
9	广西蛤蚧	蛤蚧	为壁虎科动物蛤蚧 <i>Gekko gecko</i> Linnaeus的干燥体	德保、靖西、龙州、大新、宁明等桂西南的石灰岩山地
10	广豆根	山豆根	为豆科植物越南槐 <i>Sophora tonkinensis</i> Gagnep.的干燥根和根茎	以河池、百色、南宁为中心,包括靖西、那坡、德保、田东、田阳、平果、天等等桂西南市县,隆林、田林、凌云、乐业、凤山、南丹、天峨、环江、罗城等桂西北县域,马山、忻城、都安、大化等桂中县域的石灰岩山地

序号	道地药材名	标准收载药材名	来源	道地产区
11	广佛手	佛手	为芸香科植物佛手 <i>Citrus medica</i> L. var. <i>sarcodactylis</i> Swingle 的干燥果实	以桂林灌阳为核心, 及其周边适宜地区
12	广金钱草	广金钱草	为豆科植物广金钱草 <i>Desmodium styracifolium</i> (Osbeck) Merr. 的干燥地上部分	以桂林、河池为主, 包括临桂、兴安、灌阳、资源、金城江等地及其周边适宜地区
13	广藿香	广藿香	为唇形科植物广藿香 <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. 的干燥地上部分	以贵港、平南等西江流域周边地区为主
14	天冬	天冬	为百合科植物天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. 的干燥块根	以南宁、玉林、贵港为主, 包括宾阳、横县、蒙山、平南、桂平、陆川、博白、北流等地及其周边适宜地区
15	木鳖子	木鳖子	为葫芦科植物木鳖子 <i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng. 的干燥成熟种子	以南宁、桂林、贵港、玉林、河池、崇左为主, 包括上林、临桂、全州、恭城、荔浦、桂平、容县、博白、靖西、宜州、龙州等地及其周边适宜地区
16	石决明	石决明	为鲍科动物杂色鲍 <i>Haliotis diversicolor</i> Reeve 的贝壳	以北海、防城港、钦州的海域海湾为主
17	石菖蒲	石菖蒲	为天南星科植物石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott 的干燥根茎	以桂林、河池为主, 包括全州、兴安、灌阳、龙胜、资源、田林、天峨等地及其周边适宜地区
18	石斛	石斛	为兰科植物金钗石斛 <i>Dendrobium nobile</i> Lindl.、流苏石斛 <i>Dendrobium fimbriatum</i> Hook.、束花石斛 <i>Dendrobium chrysanthum</i> Wall. ex Lindl. 或美花石斛 <i>Dendrobium loddigesii</i> Rolfe 的栽培品及其同属植物近似种的干燥茎	以桂西、桂中、桂西南、桂西北为主, 包括南宁、柳州、贵港、玉林、防城、百色、河池、崇左的武鸣、隆安、马山、上林、融水、桂平、容县、北流、上思、靖西、田林、隆林、凌云、那坡、德保、天峨、凤山、南丹、东兰、环江、都安、罗城、大化、宜州、大新、龙州、天等等地及其周边适宜地区
19	龙眼肉	龙眼肉	为无患子科植物龙眼 <i>Dimocarpus longan</i> Lour. 的假种皮	以玉林、贵港、南宁、崇左为中心, 包括玉林博白、北流、兴业、容县, 贵港平南、桂平, 钦州灵山、浦北, 南宁武鸣、横州, 崇左大新、龙州等
20	田七	三七	为五加科植物三七 <i>Panax notoginseng</i> (Burk.) F. H. Chen 的干燥根和根茎	以百色为中心, 包括田阳、右江、靖西、德保、那坡等地及其周边地区
21	生姜 (含干姜、炮姜)	生姜 (含干姜、炮姜)	为姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜或干燥根茎	以南宁、桂林、贵港、玉林、百色、来宾为主, 包括马山、上林、恭城、平乐、桂平、陆川、博白、兴业、西林、八步、钟山、富川、天峨、东兰、金秀等地
22	白及	白及	为兰科植物白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunberg) Reichb. f. 的干燥块茎	以桂林为主, 包括灌阳、资源、全州及其周边适宜地区

序号	道地药材名	标准收载药材名	来源	道地产区
23	百部	百部	为百部科植物对叶百部 <i>Stemona tuberosa</i> Lour. 的干燥块根	以桂林、百色、贵港、玉林、防城、河池、贺州为主，包括兴安、临桂、恭城、资源、田林、右江、靖西、那坡、桂平、容县、陆川、东兴、上思、天峨、南丹、东兰、富川等地
24	肉桂 (含桂枝)	肉桂 (含桂枝)	为樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮或嫩枝	“东兴桂/防城桂”以防城、东兴等为中心，辐射上思、宁明、钦州等十万大山区域的其他县域；“西江桂”以广西平南、桂平、苍梧、藤县、岑溪、容县、北流等为中心，辐射陆川、博白等地
25	合浦珍珠	珍珠	为珍珠贝科动物马氏珍珠贝 <i>Pteria martensii</i> (Dunker) 的受刺激形成的珍珠	以合浦为核心区域，包括合浦、涠洲岛及北部湾东北部合浦周边市、县的海湾
26	苏木	苏木	为豆科植物苏木 <i>Caesalpinia sappan</i> L. 的干燥心材	以桂西南、桂西北为主，包括百色、崇左的右江、田阳、田东、平果、龙州、宁明、凭祥等地及其周边适宜地区
27	杜仲	杜仲	为杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. 的干燥树皮	以桂林为中心，包括全州、兴安、永福、灌阳、龙胜、资源、融水等地
28	两面针	两面针	为芸香科植物两面针 <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC. 的干燥根	以桂中、桂南、桂东南为主，包括南宁市、武鸣、藤县、灵山、容县、八步、兴宾、大新、龙州等地及其周边适宜地区
29	吴茱萸	吴茱萸	为芸香科植物吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.、石虎 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>officinalis</i> (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>bodinieri</i> (Dode) Huang 的干燥近成熟果实。	以柳州、桂林、百色、河池、崇左为主，包括柳城、融水、全州、兴安、阳朔、藤县、凌云、乐业、田林、钟山、宜州、金城江、罗城、都安、宁明、龙州、天等等地及其周边适宜地区
30	牡蛎	牡蛎	为牡蛎科动物近江牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的贝壳	北海、钦州、防城港近海区域
31	何首乌 (含首乌藤)	何首乌 (含首乌藤)	为蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 的干燥块根或藤茎	以玉林、防城、百色为主，包括陆川、上思、凌云、乐业、田林、西林、隆林、凤山等及其周边适宜地区
32	灵芝	灵芝	为多孔菌科真菌赤芝 <i>Ganoderma lucidum</i> (Leyss. ex Fr.) Karst. 或紫芝 <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang 的干燥子实体	以柳州、桂林为主，包括融安、融水、临桂、灵川等及其周边适宜地区
33	陈皮	陈皮	为芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮	以钦州浦北为中心，辐射周边适宜地区

序号	道地药材名	标准收载药材名	来源	道地产区
34	鸡血藤	鸡血藤	为豆科植物密花豆 <i>Spatholobus suberectus</i> Dunn 的干燥藤茎	以南宁、柳州、桂林、梧州、贵港、玉林、贺州、河池、来宾、崇左为主，包括邕宁、武鸣、平乐、荔浦、苍梧、藤县、岑溪、平南、容县、北流、凌云、昭平、环江、都安、金秀、宁明、龙州等地及其周边适宜地区
35	鸡骨草	鸡骨草	为豆科植物广州相思子 <i>Abrus cantoniensis</i> Hance 或毛相思子 <i>Abrus mollis</i> Hance 的干燥全株	以玉林市福绵为中心，辐射至周边玉林市兴业、博白、陆川、北流、容县、钦州市灵山、浦北及贵港市桂平、平南等地及其周边适宜地区
36	青蒿	青蒿	为菊科植物黄花蒿 <i>Artemisia annua</i> L. 的干燥地上部分	以柳州、桂林、河池为主，包括融安、融水、全州、兴安、灌阳、南丹、罗城、巴马等及其周边适宜地区
37	虎杖	虎杖	为蓼科植物虎杖 <i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc. 的干燥根茎和根	以桂林、柳州、河池、百色、防城为主，包括资源、兴安、龙胜、全州、灌阳、融安、融水、环江、隆林、乐业、凤山、防城、上思等地及其周边适宜地区
38	罗汉果	罗汉果	为葫芦科植物罗汉果 <i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C. Jeffrey ex A. M. Lu et Z. Y. Zhang 的干燥果实	以广西桂林为中心，核心区域包括永福、临桂、龙胜及其周边适宜地区
39	使君子	使君子	为使君子科植物使君子 <i>Quisqualis indica</i> L. 的干燥成熟果实	以南宁、桂林、百色、河池、崇左为主，包括宾阳、全州、阳朔、临桂、凌云、靖西、富川、东兰、龙州、天等、宁明等地及其周边适宜地区
40	金樱子 (含金樱根)	金樱子 (含金樱根)	为蔷薇科植物金樱子 <i>Rosa laevigata</i> Michx. 的干燥成熟果实或根	以桂林、梧州、防城、贵港、玉林、河池为主，包括灌阳、苍梧、藤县、蒙山、上思、东兴、平南、桂平、博白、容县、北流、罗城、宜州、南丹、天峨、巴马、凤山等地及其周边适宜地区
41	狗脊	狗脊	为蚌壳蕨科植物金毛狗脊 <i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm. 的干燥根茎	全区各地土山沟谷
42	茯苓	茯苓	为多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	以南宁、桂林、梧州、贵港、玉林、崇左为主，包括邕宁、武鸣、横州、荔浦、苍梧、藤县、蒙山、岑溪、平南、桂平、容县、博白、北流、昭平、大化、宁明、大新等地及其周边适宜地区
43	荔枝核	荔枝核	为无患子科植物荔枝 <i>Litchi chinensis</i> Sonn. 的干燥成熟种子	以桂南为主，包括南宁邕宁、武鸣、隆安、横州，钦州浦北、灵山，玉林北流、容县、陆川，崇左江州等地及其周边适宜地区
44	南板蓝根	南板蓝根	为爵床科植物马蓝 <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek. 的干燥根茎和根	以防城、百色、河池、崇左为主，包括上思、东兴、右江、那坡、凌云、西林、靖西、南丹、天等等地及其周边适宜地区

序号	道地药材名	标准收载药材名	来源	道地产区
45	梔子	梔子	为茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	以南宁、桂林、贺州、玉林、百色、河池、来宾、崇左为主，包括马山、宾阳、龙胜、昭平、蒙山、容县、北流、隆林、西林、东兰、天峨、罗城、象州、宁明等地及其周边适宜地区
46	厚朴	厚朴	为木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Whils. 的干燥干皮、根皮及枝皮	以桂林、贺州为中心，包括资源、龙胜、全州、灌阳、八步等地及其周边适宜地区
47	砂仁	砂仁	为姜科植物阳春砂 <i>Amomum villosum</i> Lour. 的干燥成熟果实	以桂西南、桂南为主，包括武鸣、隆安、防城、上思、东兴、宁明、龙州等地及其周边适宜地区
48	骨碎补	骨碎补	为水龙骨科植物槲蕨 <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm. 的干燥根茎	以南宁、百色、桂林、贵港、崇左为主，包括邕宁、武鸣、上林、靖西、那坡、临桂、灵川、全州、永福、恭城、平南、桂平、宁明、龙州等地及其周边适宜地区
49	钩藤	钩藤	为茜草科植物钩藤 <i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil.、大叶钩藤 <i>Uncaria macrophylla</i> Wall.、毛钩藤 <i>Uncaria hirsuta</i> Havil.、华钩藤 <i>Uncaria sinensis</i> (Oliv.) Havil. 或无柄果钩藤 <i>Uncaria sessilifructus</i> Roxb. 的干燥带钩茎枝	以南宁、柳州、桂林、梧州、钦州、百色、河池、崇左为主，包括武鸣、隆安、马山、融安、融水、三江、全州、兴安、龙胜、资源、平乐、苍梧、藤县、上思、德保、凌云、靖西、宜州、罗城、巴马、都安、大化、宁明、龙州、大新等地及其周边适宜地区
50	姜黄	姜黄	为姜科植物姜黄 <i>Curcuma longa</i> L. 的干燥根茎	以南宁、防城港、钦州、玉林、百色、河池、来宾、崇左为主，包括宾阳、防城、上思、灵山、浦北、容县、陆川、博白、兴业、北流、德保、那坡、靖西、宜州、罗城、都安、金秀、宁明、龙州、大新、天等等地及其周边适宜地区
51	穿心莲	穿心莲	为爵床科植物穿心莲 <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees 的干燥地上部分	以桂南为主，包括横州、贵港、陆川、兴业、北流等地及其周边适宜地区
52	桂郁金 (含广西莪术)	桂郁金 (含广西莪术)	为姜科植物广西莪术 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 的干燥块根或根茎	钦州灵山(陆屋、广江、广隆、三隆、太平、伯劳等地)、玉林博白、河池及其周边适宜地区
53	铁皮石斛	铁皮石斛	为兰科植物铁皮石斛 <i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo 的干燥茎	以南宁、梧州、玉林、百色、河池为主，包括隆安、龙圩、藤县、防城、东兴、桂平、玉州、玉东、容县、凌云、乐业、西林、隆林、钟山、金城江、天峨、巴马等地及其周边适宜地区
54	积雪草	积雪草	为伞形科植物积雪草 <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. 的干燥全草	南宁、玉林、北海、钦州、防城港、梧州等地的丘陵平原

序号	道地药材名	标准收载药材名	来源	道地产区
55	粉葛	粉葛	为豆科植物甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth. 的干燥根	以柳州融水、融安，桂林灌阳，梧州苍梧、藤县，贵港桂平，玉林陆川，贺州八步、钟山，河池都安、罗城及崇左宁明等地为主及其周边适宜地区
56	海螵蛸	海螵蛸	为乌贼科动物无针乌贼 <i>Sepiella maindroni</i> de Rochebrune 的干燥内壳	北海、防城港、钦州的海域
57	桑叶 (含桑枝、桑白皮、桑椹)	桑叶 (含桑枝、桑白皮、桑椹)	为桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥叶、嫩枝、根皮或果穗	以桂北、桂中、桂南为主，包括柳城、蒙山、防城、上思、东兴、港北、罗城、环江、宜州、忻城等地及其周边适宜地区
58	桑寄生	桑寄生	为桑寄生科植物桑寄生 <i>Taxillus chinensis</i> (DC.) Danser 的干燥带叶茎枝	以梧州及其周边地区为主，包括万秀、长洲、龙圩、苍梧、岑溪、藤县、容县等
59	黄精	黄精	为百合科植物滇黄精 <i>Polygonatum kingianum</i> Coll. et Hemsl. 或多花黄精 <i>Polygonatum cyrtonema</i> Hua 的干燥根茎	滇黄精以百色为主，包括德保、凌云、乐业、隆林等地及其周边适宜地区，多花黄精以南宁、桂林、百色为主，包括马山、资源、全州、桂平、容县、田东、田阳、昭平、兴宾等地及其周边适宜地区
60	银杏叶	银杏叶	为银杏科植物银杏 <i>Ginkgo biloba</i> L. 的干燥叶	以桂林为中心，主要包括临桂、阳朔、灵川、全州、兴安、灌阳、龙胜、资源等地及其周边适宜地区
61	蛤壳	蛤壳	为帘蛤科动物文蛤 <i>Meretrix meretrix</i> Linnaeus 或青蛤 <i>Cyclina sinensis</i> Gmelin 的贝壳	北海、防城港、钦州的海域
62	滑石粉	滑石粉	为矿物滑石经精选净制、粉碎而成干制品	以桂林龙胜、临桂，柳州三江，河池环江，玉林陆川，南宁上林为主
63	槐花 (含槐角)	槐花 (含槐角)	为豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L. 的干燥花及花蕾或成熟果实	以桂林市为中心，包括全州、兴安、龙胜等地及其周边适宜地区
64	僵蚕	僵蚕	为蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyx mori</i> Linn. 4~5龄幼虫感染（或人工接种）白僵菌 <i>Beauveria bassiana</i> (Bals.) Vuillant 而致死的干燥体	以桂北、桂中、桂南为主，包括柳城、蒙山、防城、上思、东兴、港北、罗城、环江、宜州、忻城等地及其周边适宜地区

注：【标准收载药材名】为《中华人民共和国药典》《广西壮族自治区壮药质量标准》《广西壮族自治区瑶药材质量标准》等现行药材标准收录的药材名称。